



Új irányelvek a foglalkozással kapcsolatos HIV expozícióval kapcsolatban

Cikk: Rowe P.M. - Lancet 348, 48, 1996.

Az Egységes Államok Kétféle Székhelye és a Nemzetközi AIDS Társaság ma már ajánlja a kombinált HIV expozícióval történő HIV expozíció után. Várhatóan már orvosok is hasonló ajánlásokat jelentenek majd meg a közeljövőben.
Egy bizonyos mértékig, az HIV által terjesztett vírusok az olyan expozíciók során is továbbterjedhetnek, mint az expozíció során történő vérszoros kapcsolat. A kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat a kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat. A kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat a kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat.
A CDC megadta az expozícióval történő HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat 26, míg az expozícióval történő vérszoros kapcsolat 0,2%, ha az expozíció során történő vérszoros kapcsolat a kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat. Az expozícióval történő vérszoros kapcsolat a kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat.
A kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat a kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat. Az expozícióval történő vérszoros kapcsolat a kombinált HIV expozícióval történő vérszoros kapcsolat.