



A nonoxynol-9 HIV fertőzést megelőző képességének újraértékelése

Cikk: Wittkowski, K.M. - AIDS 9, 310, 1995

Az AIDS megelőzés egyik hatékony módja lehet a HIV-fertőzés megelőzése. Az ilyen cseréket tartalmazó szalagok használata a HIV-fertőzés megelőzésének egyik módja. Az ilyen cseréket tartalmazó szalagok használata a HIV-fertőzés megelőzésének egyik módja. Az ilyen cseréket tartalmazó szalagok használata a HIV-fertőzés megelőzésének egyik módja.

1. A placebo csoportban a nők gyakrabban használnak kondomot.

2.

3.

Az NP-ot tartalmazó szalagok alkalmazásához először nem állnak rendelkezésre megfelelő körülmények (víz), és nem zárható ki, hogy a szalagokat ismeretlen felhasználók használták.

A szalagokból történő mentesítés (100%) NP-t tartalmazó szalagok, különösen az esetek egy részén az alkalmazás során a szalagok használata során. Egy újabb, 1996-os vizsgálat szerint az NP-val való szexuális kapcsolat során a HIV-fertőzés megelőzésének. További matematikai modellek segítségével végeztünk számításokat, és igazoltuk is arra a feltevést, hogy az NP HIV-prevenzió hatékonyabb, amennyiben egyidejűleg használható másodlagos, pl. kóp

felhasználóknak, nem csak az a kondomok.

Szerzők ezért azt javasolják, hogy az NP-ot, mint a HIV-fertőzés megelőzésének legelső lépését (szexuális kapcsolat előtt) használják, és az alábbi feltételeknek megfelelően.

A fogamzásgátlás a nő részére elfogadható, és kívánatos.

A HIV-fertőzés megelőzésének első lépése az NP.

Az NP az esetek egy részén alkalmazható, és a szexuális kapcsolat során a HIV-fertőzés megelőzésének egyik módja.

Az NP-ot egyidejűleg alkalmazhatják másodlagos lépésként a HIV-fertőzés megelőzésének érdekében.

Az NP-ot használhatják az esetek egy részén, hogy a HIV-fertőzés megelőzésének érdekében.

A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a HIV-fertőzés megelőzésének érdekében az NP-ot a HIV-fertőzés megelőzésének legelső lépéséül kell használni.