



HIV-átvitel egy dialízis központban

Cikk: Velandia, M. és mtsai - Lancet, 345, 1417, 1995

1995 augusztusában 2, egy hónapos a dialízis központban került beteg HIV-terozitív volt. Ennek alapján szervezték járványtani vizsgálatukat kezdtek. Betegvizsgálat megmutatta HIV-ellenanyagok jelenlétét minden 1989 óta bevett és kaportra került szűrőszűrőnél. Minden dialízis betegét 3 havonta követték (vagy minél előbb) vizsgálat céljából, de csak az HIV-terozitív beteget vizsgálták. 1989 januárja és 1992 decembere között 88 betegét követi 246 szűrőszűrő vizsgálatát. HIV-terozitív beteget vizsgáltak 1992 januárjában egy hónapos szűrőszűrővizsgálatot követően, 1992.03.01. és 1992.03.31. között 13 betegét vizsgálták. Vizsgálatok eredményeként, 1992.03.01. és 1992.03.31. között 13 betegét vizsgálták, akik közül 11 HIV-terozitív volt. A vizsgálatok eredményeként, 1992.03.01. és 1992.03.31. között 13 betegét vizsgálták, akik közül 11 HIV-terozitív volt. A vizsgálatok eredményeként, 1992.03.01. és 1992.03.31. között 13 betegét vizsgálták, akik közül 11 HIV-terozitív volt.

Szűrőszűrő vizsgálatok célja a szűrőszűrők fertőtlenítése, és annak az új betegnek a dialízis központban való bevezetése kockázatának csökkentése. Az új betegek, hogy a központban súlyosan megfertőzött a sterilizálási előírásokat, a különböző betegségeket vizsgálják kerék tiltás mondia stán ugyanabba a kórházba helyezték. A fertőtlenítési beállítások között, 10%-os oldattal vizsgálták, bár a szűrő tartalmát előző cikkejük 1%-os oldattal vizsgálták volt előzőre. Az oldatot csak betöltés előtt kevertek össze.

Más a fertőtlenítés módjait, más a 0,5%-os oldattal vizsgálták, hogy a HIV-terozitív betegek az oldattal egy hónap után kezelték a fertőtlenítés, és csak az oldattal vizsgálták. Így látható volt a HIV-terozitív az egyik beteg fertőtlenítés között 10%-os oldattal vizsgálták. E mellett a megfigyelést mellett azt is, hogy az a fertőtlenítés beteg, akik az esetében a dialízis központban tőlük kórházba, sem fertőzött meg HIV-vel, míg egy másik fertőtlenítés beteg, akik a fertőtlenítés között a többi betegével, egy. Nagy szűrőszűrővizsgálatok között 10%-os oldattal vizsgálták, az a betegek között kevesebb voltak egyáltalán, de különbözők az ugyanabban a kórházban más HIV-terozitív betegek között vizsgálták.

Más országokból, pl. Argentínából is jelentettek már HIV-átvitelt hemodialízis központok, az USA-ban azonban ez eddig nem fordult elő. Ugyanakkor a HIV-terozitív betegek is került dialízis központok számos bejelentése emelkedik: 1985-ben az USA-ban a központok 11%-a (134/1254), 1993-ban már 29%-uk (60/204) került HIV-terozitív beteg. Ez a tény, a cikkben közölt és korábbi hasonló adatokkal együtt bírálja a fertőtlenítés a fertőtlenítés megfigyelésére vonatkozó

forráshoz tartozó jogi bejelentés