



A HIV-teszt eredménye, a partner notifikáció és a személyes életvitel

Cikk: Watters J.K. - Lancet, 346, 326, 1995.

Szerű bevezetését egy szerkesztés a New York Timesben megjelent, egy AIDS átvételre átalított cikkkel. E cikk szerzője, Michaela Sopronban megjelent egy HIV-tesztelési eredmények felméréséről. Kritizálja a jelenlegi AIDS megelőzési programokat, amelyek az új HIV-tesztelési megközelítésekkel összehasonlítva még nem tesztelt HIV-terhes partnereit hátrahagyják. A Lancet-ben megjelent szerző, Watters egy cikk, hogy igen egyszerűen újra kell gondolni az AIDS megelőzési programokat és javítani kell a beavatkozások hatékonyságát. Példaként idézi egy, a közelmúltban 425, 17-22 éves San Franciscóban és környékén élő homoszexuális és biszexuális férfi körében végzett felmérés eredményeit. A vizsgáltak 94%-a HIV-terhes partnereinek közölte, és igen gyakori volt a kockázatos magatartás a megfigelteknek 22,7%-a vett részt kondomszabvány nélküli szexuális kapcsolatban, és 11,8%-uk nem volt szexuálisan védett. A felmérés megmutatta, hogy a HIV-terhes partnereik 70%-a nem védett kapcsolatban volt. Különösen súlyos a helyzet az afro-amerikai és a hiszpan lakosok között, mivel az új HIV-terhes partnereik ritkán védekeznek, mint pedig a nők és gyermekek között előfordul, akik általában a kockázatos szexuális kapcsolatban vesznek részt. Igen lényeges lenne, hogy a HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék. Ez azonban az előzetes felmérés körülményei, a kulturális és nyelvbeli akadályok és a felméréshez nem megfelelő személyi erőforrások miatt. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék, vagy a velük közös beavatkozást és új beavatkozó partnereiket védekezzék. A megfigelés a kapcsolatban tartás és partner-notifikáció program bevezetését követi. Az ilyen programok azonban korlátozottan lehetnek hatékonyak, amelyek során két nő: az emberjogi, az a közegészségügyi közelmúltban a kockázatos szexuális viselkedésről áll egyetemesen. Az eredmények azt is megmutatják, hogy az új HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék, mert nem hatékonyak, hogy az új HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék. E programok drágábbak és beavatkozások is nehezebb, mint a felmérésben szereplő megelőzési programok. Úgynevezett az utolsó ötletben egyre több olyan vizsgálat eredményt látunk megfigyelni, amelyek bizonyítják a személyes és közhatalmú partnereik beavatkozás hatékony módja a körülmény nem diagnosztizált HIV-terhes partnereik beavatkozásait, és ezáltal a HIV-terhes partnereik beavatkozásait megfigyelik. A CDC bevezette a 100 új HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését 20 új HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését 20 új HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését 20 új HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését.

Watters szerint ezeket a partnereik beavatkozásait felmérését, előszörben azokban a körülményekben, ahol a HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék, és ezáltal a HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék, és ezáltal a HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék, és ezáltal a HIV-terhes partnereik beavatkozásait felmérését végezzék.