



A HIV infekció prevalenciája az Egyesült Államokban 1984 és 1992 között

Cikk:


A cikk kiemelt kérdése a HIV fertőzés egy országban belüli előfordulásáról vagy retrovizív vizsgálatok alapján, vagy speciális népegészségügyi vizsgálatok HIV-prevalenciáit vizsgáló eredményeként vizsgálható a következtetés. A retrovizív vizsgálat során azt vizsgálják, miként alakult a fertőzés előfordulása, hogy az előbbi vizsgálatok helyén HIV fertőzésnek kellett az adott országban az egyes évek során előfordulnia ahhoz, hogy egy adott évtől adott időn át AIDS eset fordult elő.

1999 óta több népegészségügyi vizsgálat HIV-prevalenciáit vizsgálta az Egyesült Államokban, és figyelték a retrovizív vizsgálatok módjait is. Ezeket az adatokat vetik össze az új, jelen cikkben közölt elemzés során. Ez az első olyan vizsgálat amely több fertőzött, több korábbi fertőzöttől vett adatokat is tartalmaz.

Háttér
Azt feltételezik, hogy az AIDS előfordulása az 1980-as években kezdődött el az Egyesült Államokban. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be.

Eredmények
A retrovizív vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az AIDS előfordulása az Egyesült Államokban az 1980-as években kezdődött el. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be.

Következtetések
Az AIDS előfordulása az Egyesült Államokban az 1980-as években kezdődött el. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be.



<https://aidsinfo.hu/sites/default/files/ah1006031.jpg>

Mint látható, valamennyi retrovizív vizsgálat a HIV-prevalenciát vizsgálta az Egyesült Államokban az 1980-as években. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be. A fertőzés terjedése az AIDS megelőzésének hiányában következett be.