



# Zidovudine-rezisztens HIV-1 prevalenciája gyorsan progrediáló HIV betegségben

**Cikk:** Garcia-Lerma, G. és mtsai. - AIDS 11, 1292, 1996

Egy új megfigyelés arra mutatott, hogy az AIDS-es betegeknél valószínűleg ritkábban fordul elő a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegség. Ennek vagy az oka, hogy a fertőzés előtti vagy korai szakaszban a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb ideig éltek, vagy az, hogy az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.

17 évesen megkezdett kezeléssel a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.

A 17 évesen megkezdett kezeléssel a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.

Kontrólátást követően a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.

Személyek esetében az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.

Kezeléses betegek esetében az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől. Az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.

A jelen cikkben leírtak mellett más megfigyelések is megmutatták, hogy az AZT-rezisztens vírusok akkor is gyorsabban progrediálnak, amikor AZT-terápiára nem is kerültek, tehát nem áll fenn a gyógyszer által okozott szelekciós nyomás. Szoróknak a cikkben leírtak miatt igen fontosnak tartjuk annak a vizsgálatát, hogy az AIDS-es betegek kevesebb ideig éltek, mint az AIDS-es betegek, akik nem szenvedtek HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségtől.