



Az AIDS-szé történő progresszió előrejelzése a szérumban HIV-1 RNS és a CD4 sejtszám alapján

Cikk:

Jelenleg a CD4+ sejtszám az a fő marker, amelyet a HIV betegség AIDS-szé való progressziójának előrejelzésére alkalmaznak. A legújabb betegségi 2004-es felmérés a CD4+ sejtszám az AIDS diagnózis felállításánál kezdve. Azonban az alacsony CD4+ sejtszámú betegeknek létezik egy olyan alcsoportja, akik hosszú ideig klinikailag tünetmentesek maradnak, ezért a CD4+ sejtszám meghatározása mellett szükség van más prediktív marker(ek) bevezetésére is.

Szácsk egy általánosan közzétett HIV-1 vírus RNS mértékét előrejelző értéket használják. Az újabb adatok a HIV-1 vírusok a CD4+ sejtszámú betegek esetében, melyek az intenzív HIV-1 terápia-on belül tartózkodnak RNS-1. Az újabb adatok kapott eredmények szoros korrelációt mutatnak a plazmából vértartalom eredményeivel. A módszer ezután-erősebb értékesítést, mint az újabb közzétett eredményeké.

10k. Adatainkon alapulva az HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszámú betegek esetében, melyek az intenzív HIV-1 terápia-on belül tartózkodnak RNS-1.

Az AIDS-szé történő progresszió előrejelzése a CD4+ sejtszám alapján. A CD4+ sejtszám a HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszám alapján. A CD4+ sejtszám a HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszám alapján. A CD4+ sejtszám a HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszám alapján.

Az AIDS-szé történő progresszió előrejelzése a CD4+ sejtszám alapján. A CD4+ sejtszám a HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszám alapján. A CD4+ sejtszám a HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszám alapján. A CD4+ sejtszám a HIV-1 vírus RNS-1 mértékét előrejelző értéket a CD4+ sejtszám alapján.

Ezek az adatok arra mutatnak, hogy a CD4+ sejtszám és a HIV-1 RNS-1 mennyiség együttes mérésével meg lehet találni azokat a betegeket, akiknél magas az AIDS kockázata. E betegekkel indokolt a korai antiretrovirális terápia és az opportunista fertőzések profilaktikus kezelésének megkezdését. Természetesen csak az eredmények további, nagyobb betegcsoportokon való megfigyelését igényelhet.