



A HIV-1 tropizmusa a Langerhans sejtekhez összefüggésben áll a HIV heteroszexuális átvitelével

Cikk: Soto-Ramirez L.S. és mtsai - Science 271, 1291, 1996.

Thaiföldön, Indonézia és Afrikában a Szexuálitól függően több mint 90%-a heteroszexuális úton terjedő HIV-1 fertőzések. Ezzel ellentétben a vírus az USA-ban és Nyugat-Európában a homoszexuális férfiak közötti szexuális érintkezés útján terjed, a HIV-fertőzések csak kevesebb mint 10%-a heteroszexuális úton terjed.

A HIV-1 különböző szubpopulációk közötti átterjedését vizsgálva megfigyelték, hogy az USA-ban és Nyugat-Európában a HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed. Ez a megfigyelés felveti annak a lehetőségét, hogy egyes szubpopulációk HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed. Ezt a feltevést igazolták a Thaiföldön nyert járványügyi adatok, amelyekkel összehasonlítva a HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed.

A heteroszexuális fertőzés esetén a HIV-1 fertőzés előfordulhat a Langerhans sejtek, E-CD4+ sejtek segítségével a szexuális érintkezés útján, illetve a B-lymphocyták és az indolens szexuális érintkezés útján. A fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed.

Az USA-ban és Nyugat-Európában a HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed. Ez a megfigyelés felveti annak a lehetőségét, hogy egyes szubpopulációk HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed. Ezt a feltevést igazolták a Thaiföldön nyert járványügyi adatok, amelyekkel összehasonlítva a HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed.

Az USA-ban és Nyugat-Európában a HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed. Ez a megfigyelés felveti annak a lehetőségét, hogy egyes szubpopulációk HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed. Ezt a feltevést igazolták a Thaiföldön nyert járványügyi adatok, amelyekkel összehasonlítva a HIV-1 fertőzések heteroszexuális úton terjednek, azaz a fertőzés forrása a heteroszexuális szexuális érintkezés útján terjed.